

E. Tabellen

Impfplan Österreich 2021

Alter →	Vollend. 9. Monat					1. Geburtstag			2. Geburtstag				
	in der 7. Lebens-woche	im 3. Monat	im 4.-5. Monat	im 6. Monat	im 7.-9. Monat	im 10.-11. Monat	im 12. Monat	im 13. Monat	im 14. Monat	im 15. Monat	im 16.-19. Monat	im 20.-24. Monat	
Impfung ↓													
Rotavirus ^a	1 4 Wochen	2 [4 Wochen	3]										
Diphtherie													
Tetanus													
Pertussis		1 2 Monate	2										
Poliomyelitis													
Haemophilus influenzae B													
Hepatitis B													
Pneumokokken		1 2 Monate	2										
Masern, Mumps, Röteln													
Meningokokken ACWY													
Meningokokken B ^g		1 1 Mon.	2 1 Mon.	3									
Meningokokken C ^g													
Humane Papillomaviren													
FSME ^g													
Varizellen													
Hepatitis A													
Influenza ⁱ													
Herpes Zoster													

Legende

■ Impfung empfohlen
kostenfrei

■ Nachhol-Impfung empfohlen
kostenfrei

■ Impfung empfohlen
nicht kostenfrei

■ Nachhol-Impfung empfohlen
nicht kostenfrei

■ Nachhol-Impfung empfohlen
zum vergünstigten Selbstkostenpreis

1 1. Dosis

2 2. Dosis

3 3. Dosis

4 4. Dosis

B Boosterimpfung

13 13-valente
Pneumokokkenimpfung


23 23-valente
Pneumokokkenimpfung

Hinweis:

Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszwecken teils vereinfacht. Details siehe Kapitel der jeweiligen Impfung bzw. entsprechende Fachinformation.

Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfungen bei Versäumnis ehestmöglich nachgeholt werden.



- a Bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (Rotateq, 3 Dosen)
- b Wenn nicht zuvor erfolgt, Impfung gegen Pertussis spätestens bei Schulaustritt
- c Nach Grundimmunisierung und mindestens zwei Auffrischungsimpfungen im Erwachsenenalter weitere Impfungen nur bei Indikation.
- d Auffrischung ab dem vollendeten 7. Lebensjahr
- e Kinder mit Risiken bis zum vollendeten 5. Lebensjahr kostenfrei
- f Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung frühestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen
- g Impfschema abhängig von Alter und Impfstoff

- h HPV-Nachholimpfungen zum Selbstkostenpreis für die Dauer der COVID-19 Pandemie bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. Ab vollendetem 15. Lebensjahr 3 Dosen
- i Bei Erstimpfung von Kindern bis zum vollendeten 8. Lebensjahr (tetraivalente Lebendvakzine) bzw. bis zum vollendeten 9. Lebensjahr (tetravalenter Totimpfstoff) 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen. Bei eingeschränkter Impfstoffverfügbarkeit bei Erstimpfung nur eine Dosis verabreichen (und auf die 2. Dosis nach 4 Wochen verzichten, off label). Danach 1 jährliche Impfung ausreichend

Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.